ZAHNTEAM BRILO

Aufklärung und Verhalten nach chirurgischen Eingriffen

1. Nach einer örtlichen Betäubung kann die Reaktionszeit niedrig sein. Bitte vermeiden Sie die Teilnahme am Straßenverkehr.
2. Bis zum Abklingen der Betäubung bitte nichts essen und nichts Heißes trinken, da es zu Verletzungsgefahren kommen könnte.
3. 15-20 Minuten auf den eingelegten Tupfer beißen, danach entnehmen
4. Innerhalb der nächsten 24 Stunden sollten Sie keinen Alkohol trinken und Koffein nur in geringen Mengen zu sich nehmen. Verzichten Sie außerdem auch aufs Rauchen und Saunabesuche.
5. Reinigen Sie Ihre Zähne normal, sparen Sie nur den Operationsbereich aus. Keine Munddusche verwenden und übermäßiges Spülen bitte untersagen.
6. Packungsbeilage von verordneten Medikamenten durchlesen und einnehmen.
7. Nach dem Abklingen der Betäubung kann es zu Wundschmerzen kommen. Sie können Schmerztabletten einnehmen, bitte kein Aspirin oder andere blutverdünnende Mittel
8. Den Kopf möglichst nicht tief lagern, auch beim Schlafen den Kopf etwas erhöhen
9. Sollte die Körpertemperatur über 38,5 Grad steigen oder andere Probleme, wie schwere Blutungen sollte ein Zahnarzt aufgesucht werden.
10. Sollte die Kieferhöhle eröffnet sein, nicht die Nase schnäuzen und mit offenem niesen.

Zahnteam Brilo
WÖRTHSTRAßE 16
46284 DORSTEN